

**Вид:** Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

**Заявка № 20136002 Назва сорту:** ТІТАНІУМ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210974**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення                | Код | Примітка    |
|----|---|---------------------------|-----|-------------|
| 1  | Рослина: кількість стебел                                       | одне                      | 1   |             |
| 2  | Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)                   | середня                   | 5   |             |
| 3  | Листок: положення (на початку формування головки)               | напівпряме                | 3   |             |
| 4  | Листок: за довжиною (включаючи черешок)                         | середній                  | 5   |             |
| 5  | Листок: за шириною  | середній                  | 5   |             |
| 6  | Листок: кількість часток  | середня                   | 5   |             |
| 7  | Листкова пластинка: забарвлення                                 | сіро-зелене               | 2   |             |
| 8  | Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення                   | помірна                   | 5   | до сильної  |
| 9  | Листкова пластинка: антоціанове забарвлення                     | відсутнє                  | 1   |             |
| 10 | Листкова пластинка: хвилястість краю                            | сильна                    | 7   |             |
| 11 | Листкова пластинка: зубчастість краю                            | помірна                   | 5   |             |
| 12 | Листкова пластинка: пухирчастість                               | сильна                    | 7   |             |
| 13 | Черешок: антоціанове забарвлення                                | відсутнє                  | 1   |             |
| 14 | Черешок: за довжиною  | середній                  | 5   |             |
| 15 | Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла) | короткі                   | 3   | до середніх |
| 16 | Головка: розмір   | середній                  | 5   |             |
| 17 | Головка: форма позовжнього розрізу                              | поперечношироко-еліптична | 2   |             |
| 18 | Головка: забарвлення  | блакитно-зелене           | 4   |             |
| 19 | Головка: інтенсивність забарвлення                              | помірна                   | 5   | до сильної  |
| 20 | Головка: антоціанове забарвлення                                | наявне                    | 9   |             |
| 21 | Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення                | дуже слабка               | 1   | до слабкої  |
| 22 | Головка: горбкуватість  | помірна                   | 5   |             |
| 23 | Головка: структура тканини                                      | м'яка                     | 3   |             |
| 24 | Головка: за щільністю   | щільна                    | 7   |             |
| 25 | Головка: покривний листок                                       | наявний                   | 9   |             |
| 26 | Рослина: вторинні головки (за збирання)                         | наявні                    | 9   |             |
| 27 | Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)           | слабка                    | 3   |             |
| 28 | Квітка: забарвлення   | жовте                     | 2   |             |
| 29 | Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення                       | помірна                   | 5   |             |
| 30 | Час збиральної стиглості (50% рослин)                           | середній                  | 5   | до пізнього |
| 31 | Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)   | пізній                    | 7   |             |
| 32 | Чоловіча стерильність   | наявна                    | 9   |             |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 34. Тривалість періоду до досягання, діб – 70. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.