

Вид: Капуста червоноголова *Brassica oleracea* L. var. *rubra* DC.

Заявка № 19097001 Назва сорту: Редгард **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210881

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	ознака не визначається	0	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	великий	7	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	прямостоячі	1	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	великий	7	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояцевидна	5	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	фіолетовий	5	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	темне	7	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	наявна	9	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	дуже сильний	9	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	сильна	7	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4	
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1	
19	Головка: за довжиною	коротка	3	
20	Головка: за діаметром	маленька	3	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	фіолетове	5	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	темне	7	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	ознака не визначається	0	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	фіолетове	4	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	темне	7	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 150. Ураженість хворобами: бактеріозом слизовим, % – 7; бактеріозом судинним, % – 6. Вміст сухої речовини, % – 12; загального цукру, % – 3,9; вітаміну С, мг % – 57. Лежкість, балів – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.