

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 20127006 Назва сорту: Голден Гол **Заявник (код):** 2504 **Власник сорту (код):** 2504

Дата пріоритету: 17.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	куштовий	1	
4	Лишевиткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лишевиткі сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лишевиткі сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
7	Лишевиткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лишевиткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	трикутна	1	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лишевиткі сорти. Сувіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітків	великий	7	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лишевиткі сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лишевиткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	вузький	3	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	вісімкоподібна	5	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість центрального (чревного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Насіння: маса	середня	5	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	еліптична	3	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	ознака не визначається	0	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	округла	5	
41	Насіння: за ширину в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	середня	5	
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49.1	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Раса 6	відсутня	1	
49.2	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Раса Карпа	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	відсутня	1	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 13. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 10. Тривалість плодоношення, діб – 10. Кількість бобів на рослині, шт. – 14. Вміст білка у бобах, % – 1; сухої речовини, % – 10; загального цукру, % – 1,5; вітаміну С, мг/100 г – 16.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СПП.