

**Вид:** Кукурудза цукрова *Zea mays L. ssp. saccharata* Sturt.

**Заявка № 19103018 Назва сорту:** Ліскам **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2662

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 211216**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостrenoї до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвильястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення плямок	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочек у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочек	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інbredних ліній та сортів з цукровим або розлуснім типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлуснім типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріplення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за ширину	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	до короткої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за ширину	широка	7	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлуснім типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність качанів, т/га – 2. Група стигlosti: 2 – середня. Висота прикріplення першого нижнього качана, см – 67. Вміст загального цукру, % – 7,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zae* Burr.) – 6; сажка летюча (*Sorosprium reilianum* Mc. Alp.) – 5; сажка пухирчаста (*Ustilago zae* Beckm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium moniliiforme* Sheldon.) – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.