

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus L.***Заявка № 20110014 Назва сорту:** ГРЕГОРІАН **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852**Дата пріоритету:** 10.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210986****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індегермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжузлів	середня	5	
4	Листкова пластика: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластика: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластика: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластиинки	мале	3	
7	Листкова пластика: форма апікальної лопаті	заокруглена	4	
8	Листкова пластика: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластика: пухирчастість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластика: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з що найменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тула	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стигlosti	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки. (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	середній	5	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	помірної щільноті	5	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стигlosti	зелене	3	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cicutae</i>	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i> )	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Correnspora melonis</i> )	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i> )	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 250. Вміст сухої речовини в плоді, % – 25. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стигlosti, діб – 33. Тривалість періоду плодоношення, діб – 60.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Згр.