

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 14023005 Назва сорту: ACCAC Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171272

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	просте кільце	2
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5
6	Листки: забарвлення	зелене	2
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	сильна	7
8	Листок: листочки	наявні	9
9	Листок: максимальна кількість листочків	середня	5
10	Листочек: розмір	середній	5
11	Листочек: за довжиною	середній	5
12	Листочек: за шириною	середній	5
13	Листочек: положення найширшої частини	посередині або більше до основи	1
14	Листочек: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1
15	Прилисток: за довжиною	середній	5
16	Прилисток: за шириною	середній	5
17	Прилисток: розмір	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	наявна	9
20	Прилисток: плямистість	помірна	5
21	Прилисток: щільність плямистості	середній	5
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	ознака не визначається	0
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	дуже пізній	9
24	Рослина: час цвітіння	дві	3
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	червонувато-пурпурове	3
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	вузкий	3
28	Квітка: парус за ширинкою	піднесена	3
29	Квітка: форма основи паруса	слабка	3
30	Квітка: хвилястість паруса	середній	5
31	Квітка: чашолисток за шириною	гостра	2
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	коротка	3
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	відсутні або мала	1
36	Квітконос: кількість привітків	довгий	7
37	Біб: за довжиною	середній	5
38	Біб: за шириною	суцільній	2
39	Біб: пергаментний шар	ознака не визначається	0
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	тупа	2
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	відсутні або дуже слабкий	1
42	Біб: вигин	зелене	2
43	Біб: забарвлення	помірна	5
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	середня	5
46	Біб: кількість настіннівих зачатків	сильна	7
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	сферична	5
48	Насініна: форма	простий	1
49	Насініна: тип крохмальних зерен	ознака не визначається	0
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насініна: зморшкуватість сім'ядолей	ожовте	2
51	Лише сорти з насінінами із складним типом крохмальних зерен. Насініна: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	наявна	9
52	Насініна: забарвлення сім'ядолей	слабкі	2
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: мармуровість насіннєвої шкірки	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвої шкірці	червонувато-коричневе	1
55	Насініна: забарвлення рубчика	середня	5
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначалась	0
57	Насініня: маса	ознака не визначалась	0
58,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	ознака не визначалась	0
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	19,5	27,5	29,4
Довірчий інтервал, ц/га (+)	1,4	1,6	1,3
Урожайність, ц/га	19,6	29,2	20,6
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	0,1	1,7	-8,8
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	0	6	-30
Тривалість періоду вегетації, діб	77	85	85
Висота рослини, см	81,0	85,5	87,6
Маса 1000 насінин, г	170,9	166,8	160,8
Стійкість до вилягання, бал	6,5	4,9	4,5
Стійкість до обсипання, бал	7,0	7,8	8,6
Стійкість до посухи, бал	9,0	8,7	7,8
Придатність до механізованого збирання, бал	6,0	6,6	6,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	55,5	57,7	59,2
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7,0	8,4	7,9
Стійкість проти кореневих гнилей, бал	6,0	8,6	8,4
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерна), бал	9,0	8,5	7,8
Стійкість проти антракнозу, бал	9,0	8,5	9,0
Вміст білка, %	26,9	26,1	26,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.