

**Вид:** Помідор єстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 19115022 Назва сорту:** ОЛМЕКА **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210989****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення             | Код | Примітка |
|----|--|------------------------|-----|----------|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотія  | наявне                 | 9   |          |
| 2  | Рослина: тип розвитку  | індегермінантний       | 2   |          |
| 3  | Лице детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)            | ознака не визначається | 0   |          |
| 4  | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині  | слабке                 | 3   |          |
| 5  | Лице індегермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 сучвіттям                                   | середнє                | 5   |          |
| 6  | Листок: положення (у середній третині рослини)   | напівоникле            | 7   |          |
| 7  | Листок: за довжиною  | середній               | 5   |          |
| 8  | Листок: за шириною   | вузький                | 3   |          |
| 9  | Листок: за розсіченістю  | двічі перистий         | 2   |          |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка)   | малий                  | 3   |          |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | сильна                 | 7   |          |
| 12 | Листок: глянсуватість (як для 6)   | слабка                 | 3   |          |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для 6)   | слабка                 | 3   |          |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для 6)  | малий                  | 3   |          |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі  | піднесене              | 3   |          |
| 16 | Сучвіття: за типом   | переважно не галузисте | 1   |          |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка сучвіття)  | відсутня               | 1   |          |
| 18 | Квітка: опушення прийомочки маточки  | наявне                 | 9   |          |
| 19 | Квітка: забарвлення  | жовте                  | 1   |          |
| 20 | Квітконіжка: відокремлюючий шар  | наявний                | 9   |          |
| 21 | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | середня                | 5   |          |
| 22 | Плід: розмір   | середній               | 5   |          |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра   | мале                   | 3   |          |
| 24 | Плід: форма повздовжнього розрізу  | округла                | 3   |          |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки  | слабка                 | 3   |          |
| 26 | Плід: форма поперечного перерізу   | кругляста              | 2   |          |
| 27 | Плід: загиблення біля плодоніжки   | мілке                  | 3   |          |
| 28 | Плід: розмір рубля плодоніжки  | малий                  | 3   |          |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубля  | малий                  | 3   |          |
| 30 | Плід: форма кінця плоду  | плеската               | 3   |          |
| 31 | Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі  | середній               | 5   |          |
| 32 | Плід: перикарпій за товщиною   | середній               | 5   |          |
| 33 | Плід: кількість насінневих камер   | две-три                | 2   |          |
| 34 | Плід: зелене плече (перед достиганням)   | наявне                 | 9   |          |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)  | середній               | 5   |          |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)   | сильна                 | 7   |          |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)                               | помірна                | 5   |          |
| 38 | Плід: забарвлення (за достигання)  | коричневе              | 6   |          |
| 39 | Плід: забарвлення мякоті (за достигання)   | коричневе              | 6   |          |
| 40 | Плід: за твердістю   | твердий                | 7   |          |
| 41 | Плід: термін лежкості  | помірний               | 5   |          |
| 42 | Час цвітіння   | пізні                  | 7   |          |
| 43 | Час достигання   | пізній                 | 7   |          |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за достигання)   | середній               | 5   |          |
| 45 | Наявність сріблястості   | несприятливий          | 1   |          |
| 46 | Стійкість проти <i>Meloïdogyne incognita</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 47 | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>  | наявна                 | 9   |          |
| 48 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 49 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 50 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )   | відсутня               | 1   |          |
| 51 | Стійкість проти Tomato Mosaic Virus  | наявна                 | 9   |          |
| 52 | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 53 | Стійкість проти <i>Ryzenochæta lycopersici</i>   | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 54 | Стійкість проти <i>Stemphylium spp.</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 55 | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 56 | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 57 | Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 58 | Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 59 | Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 60 | Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>   | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 61 | Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 62 | Лице індегермінантні сорти. Рослина: за висотою  | середня                | 5   |          |
| 63 | Плід: зелені смуги (перед достиганням)   | відсутні               | 1   |          |
| 64 | Плід: глянсуватість шкірки   | слабка                 | 1   |          |
| 65 | Плід: епідерміс  | знебарвлений           | 1   |          |

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 320. Вміст каротину, мг% – 0,2; сухої речовини в плоді, % – 5,9; вітаміну С, мг% – 21; загального цукру, % – 3,7. Загальна кислотність, % – 2,1. Маса товарного плоду, г – 110.Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 120. Тривалість періоду плодоношення, діб – 210.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Згр.