

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 21120003 Назва сорту: Лімасол Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2021 Патент № 211029

Дата пріоритету: 05.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211006

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|-------------------------|-----|----------|
| 1 | Насінина: забарвлення | біле | 1 | |
| 2 | Сіянець: антоціанове забарвлення | ознака не визначалась | 0 | |
| 3 | Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку) | ознака не визначалась | 0 | |
| 4 | Сіянець: форма сім'ядолей | ознака не визначалась | 0 | |
| 5 | Листок: положення у стадії 10-12 листків | напівпряме | 3 | |
| 6 | Листок: за цілісністю (як для 5) | цілісний | 1 | |
| 7 | Рослина: діаметр | середній | 5 | |
| 8 | Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків | відсутній або слабкий | 1 | |
| 9 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків | ознака не визначається | 0 | |
| 10 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю | ознака не визначається | 0 | |
| 11 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 12 | Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків | ознака не визначається | 0 | |
| 13 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі | ознака не визначається | 0 | |
| 14 | Листок: за товщиною | тонкий | 3 | |
| 15 | Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю | ознака не визначалась | 0 | |
| 16 | Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма | ознака не визначалась | 0 | |
| 17 | Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки | округла | 3 | |
| 18 | Листок: забарвлення | жовтувато-зелене | 2 | |
| 19 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 20 | Листок: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 21 | Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 22 | Листок: поширення антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 23 | Листок: тип поширення антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 24 | Листок: глянуватість верхнього боку | відсутня чи дуже слабка | 1 | |
| 25 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 | |
| 26 | Листок: розмір пухирців | від дуже малих до малих | 2 | |
| 27 | Листок: хвилястість краю | сильна | 7 | |
| 28 | Листок: надрізаність краю верхньої частини листка | наявна | 9 | |
| 29 | Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною | мілка | 3 | |
| 30 | Листок: щільність надрізаності краю | щільна | 7 | |
| 31 | Листок: за типом надрізаності | двозубчастий | 4 | |
| 32 | Листок: жилкування | віялоподібне | 2 | |
| 33 | Пазушне галуження | відсутнє або дуже слабе | 1 | |
| 34 | Час збиральної стиглості | ознака не визначалась | 0 | |
| 35 | Час початку стрілкування | пізній | 7 | |
| 36 | Рослина: за висотою (під час квітування) | ознака не визначалась | 0 | |
| 37 | Рослина: фасціація (під час квітування) | наявна | 9 | |
| 38 | Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування) | помірна | 5 | |
| 39 | Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU | наявна | 9 | |
| 40 | Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV). Патотип II | наявна | 9 | |
| 41 | Стійкість проти попелиць – <i>Nasonovia ribis-nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0 | наявна | 9 | |
| 42 | Стійкість проти збудника фузаріозу – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1 | відсутня | 1 | |
| 43 | Листок: відтінок антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 44 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків | мала | 3 | |
| 45 | Листок: кількість розчленувань | відсутня або дуже мала | 1 | |
| 46 | Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі | плаский | 3 | |
| 47 | Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 48 | Листок: площа антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 49 | Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків | мілка | 3 | |
| 50 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 51 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 52 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі | ознака не визначається | 0 | |
| 53 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 54 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті | ознака не визначається | 0 | |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 37,9. Тривалість періоду до досягання, діб – 53. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; біла гниль – 7; септоріоз – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.