

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa L. var. longifolia*

Заявка № 21546002 Назва сорту: Дзанарді **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2021 **Патент № 211030**

Дата пріоритету: 17.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211009

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	малий	3	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	сильний	3	
9	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	щільна	7	
11	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	малий	3	
12	Лише для сортів маслянистого типу в теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	вузько еліптична	1	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	пряме	1	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	еліптична	2	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	ознака не визначалась	0	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже сильна	9	
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузний і плямами	3	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	сильна	7	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвильистість краю	слабка	3	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявна	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	
30	Листок: щільність надрізаності краю	нешільна	3	
31	Листок: за типом надрізаності	правильно зубчастий	2	
32	Листок: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стигlostі	пізній	7	
35	Час початку стрілкування	середній	5	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV). Патотип II	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиць – <i>Nasonovia ribis-nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Раса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	червонуватий	1	
44	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	мала	3	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	ознака невизначається	0	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за ширину	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначається	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за ширину	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 26,9. Середня маса плоду, г – 220. Щільність головки, балів – 5. Тривалість періоду до досягнення, діб – 54. Лежкість, % – 84. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; анtrakноз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.