

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

Заявка № 20130006 Назва сорту: Ред Снепер **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210901

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Паросток: сім'ядолі за довжиною | середні | 5 | |
| 2 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 3 | Листкова пластинка: пухирчатість | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 4 | Листкова пластинка: часточковість | сильна | 7 | |
| 5 | Черешок: положення | горизонтальне | 5 | |
| 6 | Черешок: за довжиною | середній | 5 | |
| 7 | Листкова пластинка: положення | напівпряме | 3 | |
| 8 | Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток) | трикутна | 1 | |
| 9 | Листкова пластинка: вигин краю | плескатий | 2 | |
| 10 | Листкова пластинка: форма верхівки | гостра | 1 | |
| 11 | Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу | плеската | 2 | |
| 12 | Кількісне співвідношення однодомних рослин | середнє | 5 | |
| 13 | Кількісне співвідношення жіночих рослин | середнє | 5 | |
| 14 | Кількісне співвідношення чоловічих рослин | відсутнє або дуже низьке | 1 | |
| 15 | Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин) | ранній | 3 | |
| 16 | Насінина: колючки (стигле насіння) | відсутні | 1 | |
| 17 | Стійкість до <i>Peronospora farinosa</i> f. <i>spinaciae</i> | наявна | 9 | |
| 18 | Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV) | ознака не визначалась | 0 | |
| 19 | Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок | ознака не визначалась | 0 | |
| 20 | Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i> | ознака не визначалась | 0 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 23,9. Товарна врожайність, т/га – 20,8. Період від сходів до збирання врожаю, днів – 45. Маса 1000 насінин, г – 11,3. Вміст у листках: сухої речовини, % – 10,3; загального цукру, % – 1,6; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 54; нітратів, мг/100 г с.р. – 127.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.