

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009030 Назва сорту: Сінті **Заявник (код):** 2666 **Власник сорту (код):** 2666

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2022 **Патент № 220073**

Дата пріоритету: 17.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.01.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220027

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|--|--------------------------|-----|----------------|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | помірне | 5 | до сильного |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | округла | 3 | |
| 3 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 3 | |
| 4 | Листок: хвилястість краю пластинки | помірна | 2 | |
| 5 | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом | малий | 3 | |
| 6 | Листок: положення пластинки у просторі | пряме | 1 | |
| 7 | Стебло: зигзагоподібність | слабка | 2 | |
| 8 | Волость: час цвітіння | ранній | 3 | |
| 9 | Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 | до слабого |
| 10 | Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи | слабке | 3 | |
| 11 | Волость: антоціанове забарвлення пиляків | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 12 | Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками | середній | 5 | |
| 13 | Волость: положення бічних гілочок у просторі | пряме | 1 | |
| 14 | Волость: кількість первинних бічних гілочок | відсутні або дуже мала | 1 | |
| 15 | Качан: час появи шовку | ранній | 3 | |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку | відсутнє або дуже слабке | 1 | до слабого |
| 17 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | помірне | 5 | |
| 18 | Волость: розташування колосків за щільністю | середньої щільності | 5 | |
| 19 | Листок: антоціанове забарвлення піхви | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів | відсутнє або дуже слабке | 1 | до слабого |
| 21 | Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) | середня | 5 | до довгої |
| 22 | Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | коротка | 3 | |
| 23 | Волость: бічна гілочка за довжиною | середня | 5 | |
| 24.1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 24.2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною | довга | 7 | до дуже довгої |
| 25 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини | середнє | 5 | |
| 26 | Листок: пластинка за шириною | середня | 5 | |
| 27 | Качан: ніжка за довжиною | коротка | 3 | до середньої |
| 28 | Качан: за довжиною | середній | 5 | до великого |
| 29 | Качан: діаметр (посередині) | великий | 7 | |
| 30 | Качан: форма | конусно-циліндрична | 2 | |
| 31 | Качан: кількість зернових рядів | мала | 3 | |
| 32 | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен | ознака не визначається | 0 | |
| 33 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору | ознака не визначається | 0 | |
| 34 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Качан: тип зернівки | зубовидноподібний | 4 | |
| 37 | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Качан: забарвлення верхівки зернівки | жовте | 3 | |
| 39 | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок | жовто-оранжеве | 4 | |
| 40 | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення | ознака не визначається | 0 | |
| 41 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | сильне | 7 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,35 | 8,58 | 7,87 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 6,18 | 7,5 | 9,07 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,83 | -1,08 | 1,2 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 16,9 | -10,9 | 15,5 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,11 | 0,09 | 0,13 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 113 | 124 | 125 |
| Висота рослини, см | 246,3 | 267,1 | 262,1 |
| Вихід зерна, % | 82 | 81,1 | 82,8 |
| Висота прикріплення качана, см | 103 | 97,5 | 97,8 |
| Відсоток рослин з пониклими качанами, % | 62,5 | 28,8 | 7,8 |
| Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см | 5,1 | 4,7 | 4 |
| Вміст білка, % | 9,2 | 8,6 | 9,8 |
| Вміст крохмалю, % | 72,6 | 73,4 | 71,4 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 8 | 8 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти пухирчастої сажки, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти стеблової гнилі, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал | 8 | 9 | 8 |
| Група стиглості (FAO) | 3 | 3 | 3 |
| Напрямок використання | зерн | | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.