

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 15025002 Назва сорту: Ассоль **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180063

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	кущовий	1
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектонка	ознака не визначається	0
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80 % рослин)	ознака не визначається	0
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7
12	Верхівковий листочок: форма	трикутна	1
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2
15	Квітка: розмір приквітков	середній	5
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0
20	Біб: за шириною	вузкий	3
21	Біб: за товщиною	тонкий	3
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	яйцеподібна	2
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	слабка	3
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5
34	Біб: вигин дзьобика	відсутній або дуже слабкий	1
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабо шерехата	3
36	Біб: звуження (в сухому стані)	помірне	2
37	Насіння: маса	середня	5
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	слабкий	3
40	Насіння: форма поперечного перерізу	еліптична	3
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5
42	Насіння: за довжиною	середня	5
43	Насіння: кількість кольорів	один	1
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0
47	Насіння: вираження орнаменту	помірне	5
48	Час цвітіння (50 % рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5
49,1	Стійкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Pasa б	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Pasa Kappa	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна – 2,7 т/га. Висота прикріплення нижнього бобу – 13 см, висота рослин – 54 см, тривалість вегетації рослин – 105 днів. Вміст в насінні білка – 21,2 %, крохмалю – 40,2 %.

Географічні та зони рекомендації використання сорту: ЛП.