

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045032 Назва сорту: Амадеа **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180466

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	куляста	1
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	16,9	22,0	20,4
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,6	0,7	0,6
Урожайність, ц/га	10	27,7	18,7
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-6,9	5,7	-1,7
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-41	26	-8
Тривалість періоду вегетації, діб	107	109	122
Маса 1000 насінин, г	136,8	167,7	160,5
Висота рослин, см	69,9	77,0	77,0
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,2	14,3	13,1
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	вл	вл	сл
Вміст білка, %	40,8	40,4	39,9
Вміст олії, %	23,4	22,9	21,6
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.