

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045002 Назва сорту: АННЕТТЕ Заявник (код): 2440 Власник сорту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220319

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,75	3,04	3,78
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,04	-0,03	0,98
+, - до усередненої урожайності, %	60,6	-0,9	35,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	114	131	137
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	150,4	185,7	157,9
Висота рослини, см	74,8	92,2	91,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,3	13	12,9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	36,1	40	36,8
Вміст олії, %	23,1	20,5	22
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.