

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 20045012 Назва сорту:** ОАЦ Баунті **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557

**Дата пріоритету:** 03.02.2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.01.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220166**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,67	3,39	3,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,96	0,32	0,35
+, - до усередненої урожайності, %	56,3	10,5	12,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	130
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	171,4	217,8	187,8
Висота рослини, см	80,5	93,2	94
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,7	15,7	14,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	36,9	39,7	36,5
Вміст олії, %	23,3	21	22,6
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.