

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045013 Назва сорту: ОАЦ Кенді Заявник (код): 2557 Власник сорту (код): 2557

Дата пріоритету: 03.02.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220167

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|---|-----|----------|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | слабка | 3 | |
| 3 | Рослина: тип росту | від напівдетермінантного до індетермінантного напівпрямий | 3 | |
| 4 | Рослина: габітус (характер росту) | рудувато-коричневе | 2 | |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | середня | 5 | |
| 6 | Рослина: за висотою | помірна | 5 | |
| 7 | Листок: пухирчастість | загостренояцеподібна | 3 | |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) | великий | 7 | |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | сильна | 7 | |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | фіолетове | 2 | |
| 11 | Квітка: забарвлення | помірна | 5 | |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | великий | 7 | |
| 13 | Насінина: розмір | кулясто-плеската | 2 | |
| 14 | Насінина: форма | жовте | 1 | |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | ознака не визначена | 0 | |
| 16 | Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази | жовте | 2 | |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | як у насіннєвій оболонки | 1 | |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'янки рубчика | від дуже раннього до раннього | 2 | |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | від раннього до середнього | 4 | |
| 20 | Рослина: час досягання | | | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 1,71 | 3,07 | 2,8 |
| Урожайність (за стандартної вологості), т/га | 2,54 | 3,87 | 3,64 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,83 | 0,8 | 0,84 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 48,7 | 26 | 30,1 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,1 | 0,09 | 0,11 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 112 | 118 | 127 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г | 161,9 | 216,8 | 183,4 |
| Висота рослини, см | 74,7 | 82 | 89,8 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 10,8 | 14,3 | 15,4 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | 8 | 9 | 9 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти аскохітозу, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 9 | 8 | 8 |
| Стійкість проти септоріозу, бал | 9 | 8 | 8 |
| Стійкість проти фузаріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Вміст білка, % | 37,1 | 41,3 | 38,4 |
| Вміст олії, % | 23,6 | 20,9 | 22,2 |
| Блок (Група стиглості) | 7 | 7 | 7 |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |
| Якість | сбіл, вл | сбіл, сл | сбіл, вл |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.