

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045063 Назва сорту:** Перепілочка **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.01.2022 **Патент № 220240**

**Дата пріоритету:** 22.12.2017

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220234**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,7	2,94	2,8
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,02	0,65	0,92
+, - до усередненої урожайності, %	1,4	28,4	49,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	106	104	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	146	179	161,1
Висота рослини, см	61,8	73,3	85,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,3	9,1	12
Дружність досягання, бал	9	8	7
Кількість бобів на рослині, шт	8	8	8
Кількість зерен у бобі, шт	7	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	35,7	39,8	34,9
Стійкість проти септоріозу, бал	24,3	21,8	23,2
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	6	6
Вміст білка, %	зерн	зерн	зерн
Вміст олії, %	сбіл, вл	сбіл, сл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.