

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045030 Назва сорту: Ананда Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180465

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричнєве	3
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	16,1	23,2	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,5	1,5	
Урожайність, ц/га	13,0	25,4	
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-3,1	2,2	
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-20	10	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	137	
Маса 1000 насінин, г	139,0	177,6	
Висота рослини, см	74,7	86,1	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13,4	15,3	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Якість	вл	сл	
Вміст білка, %	39,6	39,8	
Вміст олії, %	22,1	21,9	
Напрямок використання	зерновий	зерновий	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.