

**Вид:** Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

**Заявка № 20304006 Назва сорту:** Білоцерківський **Заявник (код):** 2714 **Власник сорту (код):** 2714

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 15.12.2021 **Патент № 211066**

**Дата пріоритету:** 27.10.2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 211095**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	ранній	3	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	нешкільна	3	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	нешкільна	3	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	жовто-зелене	1	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нешкільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нешкільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	на півліні	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення центрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення центрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нешкільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вірізи за глибину	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вірізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко перекриваються	6	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	низька	3	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нешкільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нешкільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	ранній	3	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	великий	7	
33	Гроно: за щільністю	нешкільне	3	
34	Гроно: ніжка первинного гrona за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	великий	7	
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелене	2	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення мякоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість мякоті	помірно тверда	2	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілі пагіни: основне забарвлення	жовтувато-коричневе	1	

#### За інформацією наданою заявником:

##### - показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 12,2. Середній урожай з куща, кг – 11,2. Середня маса 100 ягід, г – 670,0. Середня маса гrona, г – 520,0. Горошиння ягід, % – 2,0. Roztrісування ягід, % – 1,0. Лежкість при зберіганні, діб – 30. Вихід соку, % – 63,0. Вміст диглікозидів, мг/дм<sup>3</sup> – 2,4; кислот у ягодах, г/л – 4,5. Цукристість соку ягід, % – 16,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 7; міldью – 7; oїdium – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 7; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti, діб – 110. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Група стигlosti – рс. Напрям використання – стл. Схема садіння, м – 3 × 3. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.