

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 14045025 Назва сорту: Віола Заявник (код): 1498 Власник сорту (код): 1498

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171437

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	малий	3
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричнєве	3
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,2	20,6	20,3
± до усередненої урожайності, ц/га	-1	-0,9	0,5
± до усередненої урожайності, %	-7	-4	3
Маса 1000 насінин, г	123,2	151,2	156,8
Висота рослин, см	69,2	62,6	78,7
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,7	8,4
Стійкість до осипання, бал	8,7	8,4	8,7
Стійкість до засухи, бал	8,2	8,0	8,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,9	10,2	10,6
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	8,7	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	8,7	8,8
Стійкість до бактеріозу, бал	8,7	8,6	8,8
Стійкість до септоріозу, бал	8,7	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	8,5	9,0
Вміст білку, %	42,1	41,8	40,2
Вміст олії, %	23,0	22,3	21,2
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	15,2	21,4	19,7
Довірчий інтервал (ц/га), ±	0,32	0,50	0,57

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.