

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 15045004 Назва сорту:** ДШ863 **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.12.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171439**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,6	23,0	20,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,0	1,3	0,9
Урожайність, ц/га	11,8	23,0	19,4
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-5,8	0	-1,3
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-33	0	-6
Тривалість періоду вегетації, діб	106	117	123
Маса 1000 насінин, г	142,9	178,1	186,3
Висота рослини, см	59,0	72,8	74,1
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,9	13,8	15,4
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	сл	сл	сл
Вміст білка, %	44,1	44,1	44,2
Вміст олії, %	21,8	21,0	20,2
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.