

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 17088008 Назва сорту: Брук **Заявник (код):** 1986 **Власник сорту (код):** 1986

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.01.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Світловий паросток: розмір | середній | 5 | |
| 2 | Світловий паросток: форма | конічна | 3 | |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | помірна | 5 | |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | відсутнє або дуже мале | 1 | |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | середня | 5 | |
| 7 | Світловий паросток: форма верхівки | відкрита | 5 | |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | середня кількість | 5 | |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною | середні | 5 | |
| 12 | Рослина: тип розвитку | стебловий | 1 | |
| 13 | Рослина: габітус | прямий | 3 | |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 15 | Листок: загальний розмір | малий | 3 | |
| 16 | Листок: за відкритістю | відкритий | 5 | |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | помірне | 5 | |
| 18 | Листок: зелене забарвлення | світле | 3 | |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір | дуже великий | 9 | |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за ширину | вузькі | 3 | |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення | середньо | 5 | |
| 23 | Листочек: хвильистість краю | слабка | 3 | |
| 24 | Листочек: загиблення жилок | мілке | 3 | |
| 25 | Листочек: глянсуватість верхнього боку | не глянсуватий | 3 | |
| 26 | Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки | наявне | 9 | |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 28 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння | обрідне | 3 | |
| 30 | Суцвіття: розмір | середній | 5 | |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 32 | Віночок квітки: розмір | середній | 5 | |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку | відсутнє або дуже слабка | 1 | |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку | відсутнє або мале | 1 | |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | відсутнє або дуже мале | 1 | |
| 36 | Рослина: час достигання | ранній | 3 | |
| 37 | Бульба: форма | короткоовальна | 2 | |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною | мілкі | 3 | |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки | жовте | 2 | |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічки | жовте | 2 | |
| 41 | Бульба: забарвлення мякоті | кремове | 2 | |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | сильне | 7 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|---|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 23,52 | 19,74 | |
| Урожайність, т/га | 24,99 | 20,38 | |
| +,- до усередненої урожайності, т/га | 1,47 | 0,64 | |
| +,- до усередненої урожайності, % | 6,3 | 3,2 | |
| Довірчий інтервал, т/га | 2,19 | 1,73 | |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 89 | 80 | |
| Середня маса товарної бульби, г | 84,3 | 84,3 | |
| Вміст крохмалю, % | 19,4 | 17,5 | |
| Збір крохмалю, т/га | 4,8 | 3,6 | |
| Вміст сухої речовини, % | 28,3 | 25,9 | |
| Дегустаційна оцінка, бал | 7 | 6 | |
| Придатність до механізованого збирання, бал | 8 | 8 | |
| Лежкість, бал | 7 | 9 | |
| Товарність бульб, % | 78,5 | 81,4 | |
| Стійкість проти макроспоріозу, бал | 8 | 9 | |
| Стійкість проти фітофторозу, бал | 7 | 5 | |
| Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал | 9 | 9 | |
| Блок (група стиглості) | 7 | 7 | |
| Напрям використання | унів | унів | |
| Якість | пк | пк | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.