

**Вид:** Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor***Заявка №** 20094002 **Назва сорту:** Вінтер **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669**Дата пріоритету:** 16.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.02.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 220292**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листя: забарвлення	сірувато-зелене	5	
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	середній	5	
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	середній	5	
5	Листочок: за шириною	середній	5	
6	Листочок: місце максимальної ширини	посередині	2	
7	Квітка: за довжиною	середня	5	
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9	
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2	
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	мале	3	
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
13	Рослина: за висотою	середня	5	
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	середня	5	
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	середній	5	
17	Суха насінина: форма поздовжнього розрізу	еліптична	2	
18	Суха насінина: маса 100 насінин	середня	5	
19	Суха насінина: забарвлення насінневої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1	
20	Суха насінина: чорна пігментація рубчика	наявна	2	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність насіння, т/га – 3,8; зеленої маси, т/га – 52,0. Вміст білка в зеленій масі, % – 17. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 4. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 6. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб: бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.), бал (1–9) – 8; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.), бал (1–9) – 7; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.), бал (1–9) – 6; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.), бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників: бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Boh.), бал (1–9) – 5; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.), бал (1–9) – 8; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.), бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.