

Вид: Костриця очеретяна *Festuca arundinacea* Schreb.

Заявка № 20205001 Назва сорту: РОСТУК **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.01.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220005

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	гексаплойд	6	
2	Лиші для F.r. Рослина: габітус (весни в рік висіву)	ознака не визначається	0	
3	Лиші для F.a. Листки: за фактурою	помірні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення протягом вегетаційного періоду	сильна	7	
5	Лиші для F.r. Рослина: за довжиною (наприкінці вегетаційного періоду до яровизації)	ознака не визначається	0	
6	Рослина: тенденція до формування суцвіття (без яровизації)	помірна	5	
7	Рослина: за природною висотою після яровизації (блізько 4 тижнів після початку вегетації)	середня	5	
8	Рослина: час утворення суцвіття (після яровизації)	середній	5	
9	Рослина: габітус з появою суцвіття	напівпрямий	3	
10	Рослина: за природною висотою з появою суцвіття	висока	7	
11	Рослина: найдовше стебло із суцвіттям включно за довжиною (за повного формування)	середнє	5	
12	Прапорцевий листок: за ширину	середній	5	
13	Суцвіття: за довжиною (як для 11)	середнє	5	
14	Прапорцевий листок: за довжиною на типовому стеблі (як для 11)	довгий	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 50.8. Вміст білка, % – 5; клітковини, % – 25. Висота рослин, см – 112. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стигlosti, діб – 98. Зимостійкість, балів (1–9) – 68. Маса 1000 насінин, г – 2.8. Посухостійкість, балів (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, балів (1–9) – 7. Стійкість до обсипання, балів (1–9) – 8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса – 7; сажка – 7; стеблова іржа – 7; антракноз – 8; снігова пліснява – 8. Поява сходів після сівби, діб – 7. Ступінь приживання, % – 80. Щільність паростків, % – 60. Загальна декоративність навесні, бал (11–99) – 80; влітку – 92; весни – 75. Проектне покриття до скошування, % – 85; після скошування, % – 70. Група стигlosti: 5 – середня. Стійкість до витоптування, бал (1–9) – 9. Темпи відростання: 5 – рівномірне. Утворення потужної дернини, бал (1–9) – 7. Тонколистність, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.