

Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

Заявка № 18364001 Назва сорту: Південна красуня **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.03.2022 **Патент № 220357**

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.02.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220280

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	відсутня або дуже низька	1	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	низька	3	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	низька	3	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожай насіння (за вологості 14%), т/га – 0,32. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 6,6. Вміст білка, % – 15,8; клітковини, % – 29,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 5; пероноспороз – 8; іржа – 8; чорна плямистість стебел – 8; аскохітоз – 7; бура плямистість – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.