

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill  
 Заявка № 15045012 Назва сорту: ОАЦ Страйв Заявник (код): 1898 Власник сорту (код): 1898  
 Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №  
 Дата пріоритету:  
 Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017  
 Свідоцтво про державну реєстрацію № 171446  
 Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,6	23,0	20,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,0	1,3	0,9
Урожайність, ц/га	12,6	25,5	18,1
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-5,0	2,5	-2,7
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-28	10	-13
Тривалість періоду вегетації, діб	112	120	124
Маса 1000 насінин, г	148,4	186,8	197,1
Висота рослини, см	67,6	92,2	79,8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,1	14,0	12,5
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	вл	вл	сл
Вміст білка, %	42,5	42,2	42,2
Вміст олії, %	23,0	22,1	21,2
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.