

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 15045022 Назва сорту: РЖТ СТУМПА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2017
Свідоцтво про державну реєстрацію № 171449

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1
18	Насінина: забарвлення сім'янижки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,6	23,0	20,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,0	1,3	0,9
Урожайність, ц/га	11,3	26,2	22,3
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-6,3	3,2	1,6
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-36	14	8
Тривалість періоду вегетації, діб	109	117	119
Маса 1000 насінин, г	137,2	166,3	182,0
Висота рослини, см	59,5	73,2	73,1
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	14,1	15,6
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	вл	вл	сл
Вміст білка, %	40,4	40,0	40,9
Вміст олії, %	23,1	22,3	21,6
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.