

Вид: Помідор юстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 21115020 Назва сорту:** Делічіо **Заявник (код):** 2813 **Власник сорту (код):** 2813**Дата пріоритету:** 03.08.2021**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 25.02.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220326****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індегермінантний	2	
3	Лише індегермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індегермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	довге	7	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за ширину	середній	5	
9	Листок: за розстченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опущення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість бля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругла	2	
27	Плід: загиблення бля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір кінця плоду	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досягнням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досягнням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досягнням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягнання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення мякоті (за досягнання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягнання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягнання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприєдливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9	
53	Стійкість проти <i>Pyrrenochoaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium spp.</i>	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia salanacearum</i>	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індегермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досягнанням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Вміст каротину, мг% – 16,2; сухої речовини в плоді, % – 5,34; вітаміну С, мг% – 4,5; загального цукру, % – 3,63. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 20.Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 120. Тривалість періоду плодоношення, діб – 60. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.