

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045021 Назва сорту: РЖТ СФОРЗА Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171448

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	трикутна	2
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	ранній	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	15,2	22,1	19,3
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,9	1,1	1,1
Урожайність, ц/га	10,7	23,2	20,3
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-4,5	1,1	1,0
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-30	5	5
Тривалість періоду вегетації, діб	109	119	121
Маса 1000 насінин, г	139,7	160,4	164,3
Висота рослини, см	64,3	82,1	80,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,8	12,7	13,5
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	сл	сл	сл
Вміст білка, %	45,7	45,5	45,9
Вміст олії, %	21,7	20,2	19,9
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.