

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa L. var. capitata*

Заявка № 20421002 Назва сорту: Аналотта **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220311

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напротивне	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цилісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	середній	2	
9	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
10	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	щільна	7	
11	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	середній	5	
12	Лиши для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
13	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	округла	3	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	напротивне	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	поперечно вузько еліптична	6	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхківи	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирців	середній	5	
27	Листок: хвильистість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	відсутні	1	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листок: щільність надрізаності краю	ознака не визначається	0	
31	Листок: за типом надрізаності	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластина: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стигlosti	середній	5	
35	Час початку стрілкування	середній	5	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	висока	7	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	сильна	7	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV). Патотип II	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиці – <i>Nasonovia arabis</i> pigr (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Рівень 1	відсутня	1	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	червонуватий	1	
44	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	опуклий	5	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за ширину	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за ширину	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 90. Середня маса головки, г – 500. Щільність головки, бал (1–9) – 8. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стигlosti, діб – 56. Група стигlosti: 5 – середня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 6; цукрів, % – 1; вітаміну С, мг% – 4. Холодостійкість, бал (1–9) – 6. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhanuz) – 9; чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 6; септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 6; вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 9. Стійкість до пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): попелиця – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.