

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 15045023 Назва сорту: РЖТ ШУНА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2017
Свідоцтво про державну реєстрацію № 171450

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|---|-----|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 |
| 3 | Рослина: тип росту | від напівдетермінантного до індетермінантного | 3 |
| 4 | Рослина: габітус (характер росту) | напівпрямий | 3 |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | сіре | 1 |
| 6 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 7 | Листок: пухирчастість | сильна | 7 |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) | загостренояцеподібна | 3 |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | середній | 5 |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 11 | Квітка: забарвлення | фіолетове | 2 |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | помірна | 5 |
| 13 | Насінина: розмір | середній | 5 |
| 14 | Насінина: форма | округло-видовжена | 5 |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовто-зелене | 2 |
| 16 | Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази | ознака не визначалась | 0 |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | чорне | 6 |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'яної рубчика | інше | 2 |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | від дуже раннього до раннього | 2 |
| 20 | Рослина: час досягання | ранній | 3 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 16,9 | 22,0 | 20,4 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Урожайність, ц/га | 13,1 | 23,5 | 21,0 |
| +,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га | -3,8 | 1,5 | 0,5 |
| +,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, % | -23 | 7 | 3 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 105 | 111 | 115 |
| Маса 1000 насінин, г | 145,3 | 135,1 | 171,1 |
| Висота рослини, см | 59,9 | 82,9 | 79,6 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 8 | 9 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 8 | 8 | 9 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 8 | 8 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 10,6 | 10,8 | 13,1 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти аскохітозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти септоріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти фузаріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Якість | вл | сл | сл |
| Вміст білка, % | 42,2 | 42,0 | 42,9 |
| Вміст олії, % | 22,4 | 21,6 | 20,6 |
| Напрямок використання | зерновий | зерновий | зерновий |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.