

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045043 Назва сорту: Таурус Заявник (код): 142 Власник сорту (код): 142

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171453

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,6	23,0	20,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,0	1,3	0,9
Урожайність, ц/га	12,2	28,3	20,1
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-5,4	5,0	-0,6
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-31	23	-3
Тривалість періоду вегетації, діб	108	115	120
Маса 1000 насінин, г	138,1	192,6	169,1
Висота рослини, см	73,9	89,3	88,6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,6	13,9	15,1
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	вл	сл	сл
Вміст білка, %	44,6	44,1	44,9
Вміст олії, %	22,4	21,1	20,0
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**