

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263017 Назва сорту: Вінтер Голд **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220344

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на коротких пагонах	1	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	світло-коричневе	3	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	сильне	3	
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	великий	7	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	низький	3	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	приплюснута-куляста	7	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	сильна	3	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	слабка	3	
39	Плід: характер покривного забарвлення	слабко визначений рум'янець із чітко визначеними смугами	4	
40	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	середня	2	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	середня	5	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	широка	7	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	пізній	7	
56	Час збирання врожаю	дуже пізній	9	
57	Час споживчої стиглості	дуже пізній	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 55,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 63,9. Маса плоду (максимальна), г – 92,6. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 9,1; загального цукру, % – 10,91; пектинових речовин, % – 0,52; сухих розчинних речовин, % – 20,7. Загальна кислотність, % – 1,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carposcapa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 9 – пізньозимовий. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодівий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, днів – 80. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 x 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.