

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 20045005 Назва сорту: КРЕОЛА **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.05.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220371
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного напівпрямий	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	рудувато-коричневе	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	середня	5	
6	Рослина: за висотою	помірна	5	
7	Листок: пухирчастість	великий	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	сильна	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	фіолетове	2	
11	Квітка: забарвлення	помірна	5	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	середній	5	
13	Насінина: розмір	куляста	1	
14	Насінина: форма	жовте	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	ознака не визначена	0	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	майже чорне	5	
17	Насінина: забарвлення рубчика	як у насінній оболонці	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	від раннього до середнього	4	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання			

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,56	3,07	3,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,85	0	0,54
+, - до усередненої урожайності, %	49,6	0	19,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	110	120	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	149,5	175,6	178
Висота рослини, см	62	80,3	80,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,2	9,5	9,9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37,3	40,5	37,6
Вміст олії, %	23,4	21,2	22
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.