

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045004 Назва сорту: К'ЯКІ **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.05.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220370

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кульисто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,77	3,31	3,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,06	0,24	0,61
+, - до усередненої урожайності, %	61,8	7,7	21,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	113	128	132
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	139,8	166	139,8
Висота рослини, см	75,3	96,5	97,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,8	15,3	17,6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	36,7	39,4	37,2
Вміст олії, %	22,6	20,4	21,7
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.