

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch

Заявка № 16259003 Назва сорту: Печерський Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.05.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180829

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: розмір	середній	5
2	Дерево: за силою росту	середнє	5
3	Дерево: габітус	розлогий	3
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	нешільне	3
9	Квітка: тип	розетковий	2
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	світло-рожеве	3
11	Пелюстка: форма	округла	5
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	широка	4
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	на одному рівні	2
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2
17	Пиляки: пилок	наявний	9
18	Зав'язь: опушення	наявне	9
19	Прилистки: за довжиною	короткі	3
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1
25	Листкова пластинка: кут основи	тупий	3
26	Листкова пластинка: кут верхівки	середній	5
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	наявне	9
29	Черешок: за довжиною	середній	5
30	Черешок: нектарники	наявні	9
31	Черешок: форма нектарників	ниркоподібна	2
32	Плід: розмір	середній	5
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	помірно асиметричний	2
37	Плід: помітність шва	помірна	5
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	середня	5
40	Плід: основне забарвлення шкірки	рожево-біле	7
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	велика	7
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	рожево-червоний	3
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	плямистий	2
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9
45	Плід: щільність опушення шкірки	щільне	7
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глясуватість	ознака не визначається	0
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	помірно	5
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	кремово-біле	3
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	відсутнє або слабке	1
55	Плід: волокнистість м'якоті	помірна	2
56	Плід: цукристість	середня	5
57	Плід: кислотність	помірна	3
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	середній	5
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
62	Кісточка: рельєфність поверхні	порівну ямки і борізки	3
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	слабка	3
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	слабкий	3
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	середній	5
67	Час початку цвітіння	середній	5
68	Час споживої стиглості	від середнього до пізнього	6

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність – 30,0 т/га, середній урожай з дерева – 37,0 кг, середня маса плоду – 135,0 г, максимальна – 170,0 г. Вміст у плодах вітаміну С – 10,74 мг%, загального цукру – 7,87 %, пектинових речовин – 0,3 %, сухої речовини – 10,82 %, загальна кислотність – 0,85 %. Стійкість до кокомікозу – 9 балів, моніліального опіку – 7, парші та клястероспоріозу – 8 балів, до пошкодження кісточковою мухою – 8 балів, попелицею – 9. Вимерзання квіткових бруньок – 2 бала. Зимостійкість – 8 балів, посухостійкість – 9. Група стиглості – середня, напрям використання – універсальний. Дегустаційна оцінка – 8, транспортабельність – 7 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**