

**Вид:** Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*

**Заявка № 21094001 Назва сорту:** Авалон **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.08.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220459**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листя: забарвлення	помірно зелене	2	
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	пізній	7	
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	довгий	7	
5	Листочок: за шириною	широкий	7	
6	Листочок: місце максимальної ширини	посередині	2	
7	Квітка: за довжиною	середня	5	
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9	
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2	
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	мале	3	
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
13	Рослина: за висотою	середня	5	
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	середня	5	
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	короткий	3	
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	вузький	3	
17	Суша насінина: форма повздовжнього розрізу	неправильної форми	3	
18	Суша насінина: маса 100 насінин	мала	3	
19	Суша насінина: забарвлення насінневої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1	
20	Суша насінина: чорна пігментація рубчика	наявна	2	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння, т/га – 5,6; зеленої маси – 57. Вміст білка в зеленій масі, % – 25,5. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.) – 8; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.) – 8; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Boh.) – 7; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.) – 7; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.