

Вид: Конюшина перевернута *Trifolium resupinatum* L.

Заявка № 22246001 Назва сорту: Фелікс **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220462

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	7	
3	Рослина: природна висота (висота основної зеленої маси)	середня	5	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	зелена	5	
5	Час початку цвітіння	помірний	5	
6	Час повного цвітіння	помірний	5	
7	Період від початку до повного цвітіння	короткий	3	
8	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
9	Стебло: кількість міжвузлів	помірна	5	
10	Стебло: за довжиною	середнє	5	
11	Стебло: за товщиною	товсте	7	
12	Рослина: щільність опушення	помірної щільності	5	
13	Листок: довжина середнього листочка	середній	5	
14	Листок: ширина середнього листочка	середній	5	
15	Листочок: частота рослин з білими мітками	мало	3	
16	Суцвіття: за розміром	мале	3	
17	Суцвіття: забарвлення квіток	світло-рожеве	1	
18	Суцвіття: рясність цвітіння	мала	3	
19	Суцвіття: за формою	округла	1	
20	Рослина: габітус	напівстоячий	3	
21	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	зелена	5	
22	Насінина: за кольором	темно-фіолетове (майже чорне)	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,25. Збір сухої речовини, т/га – 7,8. Вміст у сухій речовині, %: білка – 19,0; клітковини – 24,0. Облистяність, % – 65. Кількість укосів, шт. – 3. Тривалість періоду від сходів до укісної стиглості, діб – 58; до збиральної стиглості насіння, діб – 90. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 1,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; іржа – 7; антракноз – 8; аскохітоз – 7; бура плямистість – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бульбочкові довгоносики – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.