

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Заявка № 21136003 Назва сорту: Вікаріо **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.08.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220452

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість стебел	одне	1	
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	середня	5	
3	Листок: положення (на початку формування головки)	напівпряме	3	
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
5	Листок: за шириною	середній	5	
6	Листок: кількість часток	мала	3	
7	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
14	Черешок: за довжиною	середній	5	
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	короткі	3	
16	Головка: розмір	середній	5	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-еліптична	3	
18	Головка: забарвлення	сіро-зелене	3	
19	Головка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
20	Головка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: структура тканини	м'яка	3	
24	Головка: за щільністю	помірна	5	
25	Головка: покривний листок	відсутній	1	
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	наявні	9	
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	слабка	3	
28	Квітка: забарвлення	жовте	2	
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
30	Час збиральної стиглості (50% рослин)	середній	5	
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	середній	5	
32	Чоловіча стерильність	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 6. Тривалість періоду до досягання, діб – 65. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.