

Вид: Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

Заявка № 21218002 Назва сорту: Акіро **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220419

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повністю розвинений листок)	середня	5	
7	Листок: зубчатість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: за висотою (під час бутонізації)	середня	5	
12	Час цвітіння	ранній	3	
13	Рослина: за висотою під час цвітіння	висока	7	
14	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
15	Рослина: за загальною довжиною	довга	7	
16	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
17	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
18	Стручок: за шириною	середній	5	
19	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
20	Стручок: кількість насінин	велика	7	
21	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
22	Тенденція до формування суцвіття в рік сівби за пізньолітнього вирощування	сильна	7	
23	Корінь: забарвлення	біле	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 2,45. Тривалість періоду до досягання насіння, днів – 63. Стійкість до обсіпання, балів (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 8,8. Ураження хворобами: гниллю білою, % – 7; гниллю мокрою, % – 8; чорною ніжкою, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.