

**Вид:** Редька чорна *Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Kerner

**Заявка № 21652001 Назва сорту:** Стінгер **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.08.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220471**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1	
3	Сім'ядолі: форма	широкосерцеподібна	2	
4	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
5	Листкова розетка: кількість повністю розвинутих листків	велика	7	
6	Листок: положення у просторі	пряме	1	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	жовтуватий	5	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: лопаті (розсіченість до центральної жилки)	наявна	9	
12	Листкова пластинка: кількість лопатей (як для 11)	дуже велика	9	
13	Листкова пластинка: розмір кінцевої лопаті	середній	5	
14	Листкова пластинка: розрізи краю за глибиною	середні	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
16	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5	
18	Коренеплід: форма	льодяна бурульна	9	
19	Коренеплід: форма головки кореня	округла	2	
20	Коренеплід: форма основи	округла	4	
21	Коренеплід: забарвлення шкірки	біле	1	
22	Лише для сортів з білим коренеплодом. Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення країв головки	ознака не визначається	0	
23	Лише для сортів з білим коренеплодом. Коренеплід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Коренеплід: горбкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
25	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1	
26	Час збиральної стиглості	середній	5	
27	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Тривалість періоду до досягання, діб – 88. Середня маса плоду, г – 220. Вміст сухої речовини, % – 7,3; вітаміну С, мг/100 г – 28,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 8; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.