

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa L. var. secalina***Заявка № 21120004 Назва сорту:** Афіліон **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.08.2022 **Патент №** 220508**Дата пріоритету:** 23.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.08.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 220472**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	ознака не визначалась	0	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	ознака не визначалась	0	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	відсутній або слабкий	1	
9	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	дуже тонкий	1	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	пряме	1	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	оберненояйцеподібна	7	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвильястість краю	помірна	5	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	відсутня	1	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	відсутня або дуже мілка
30	Листок: щільність надрізаності краю	дуже нещільна	1	
31	Листок: за типом надрізаності	городчастий	1	
32	Листок: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне галуження	відсутнє	1	
34	Час збиральної стигlosti	або дуже слабке		
35	Час початку стрілкування	ознака не визначалась	0	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	дуже пізній	9	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	дуже слабка	1	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць – <i>Nasonovia arabis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Раса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
44	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	середня	5	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	опуклий	5	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за ширину	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за ширину	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 35,4. Тривалість періоду до досягнення, діб – 44. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; біла гниль – 7; септоріоз – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.