

Вид: Селера черешкова *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers.

Заявка № 22554001 Назва сорту: Арітра **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.08.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220456

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 2 | Рослина: кількість бічних пагонів | ознака не визначалась | 0 | |
| 3 | Листки: положення в просторі | від прямого до напівпрямого | 2 | |
| 4 | Листки: кількість | середня | 5 | |
| 5 | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення (за виключенням черешка) | сильна | 7 | |
| 6 | Листки: глянуватість | помірна | 5 | |
| 7 | Листки: пухирчастість | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: за довжиною (разом з черешком) | середній | 5 | |
| 9 | Листок: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків | середня | 5 | |
| 10 | Листок: розмір верхівкового листочка | середній | 5 | |
| 11 | Листочок: форма краю верхівки | гостра | 1 | |
| 12 | Листочок: щільність надрізів краю | помірної щільності | 5 | |
| 13 | Листочок: розміщення часток | дотичне | 2 | |
| 14 | Черешок: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 15 | Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 16 | Черешок: за довжиною | довгий | 7 | |
| 17 | Черешок: за шириною | середній | 5 | |
| 18 | Черешок: ребристість | помірна | 5 | |
| 19 | Черешок: профіль поперечного перерізу внутрішньої частини | дуже увігнутий | 3 | |
| 20 | Черешок: суцільне знебарвлення | відсутнє | 1 | |
| 21 | Лише для сортів, у яких відсутнє суцільне знебарвлення. Черешок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси, в т. ч. урожайність черешків без листової пластинки, т/га – 8. Тривалість періоду від сходів до збирання товарної продукції, діб – 120. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe umbeliferarum* D.B.) – 6; церкоспороз (*Cercospora apii* Fres.) – 6. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): морквяна муха (*Psila rosae* F.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.