

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum x hortorum* Bailey

Заявка № 20416002 Назва сорту: Степівчанка Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 Патент № 220491

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220442

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|-----------------------------|-----|------------|
| 1 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 2 | Рослина: тип | кущовий | 2 | |
| 3 | Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма | напівсферична | 3 | |
| 4 | Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузження | щільна | 7 | |
| 5 | Стебло: забарвлення | зелене | 1 | |
| 6 | Прилисток: розмір | середній | 5 | |
| 7 | Черешок: положення | напіввертикальне | 3 | |
| 8 | Черешок: довжина відносно довжини листка | середня | 3 | |
| 9 | Листок: за довжиною (разом з черешком) | середній | 5 | |
| 10 | Листок: за шириною | широкий | 7 | |
| 11 | Листок: співвідношення довжина/ширина | середнє | 5 | |
| 12 | Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка | середня | 5 | |
| 13 | Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення | середнє | 5 | |
| 14 | Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення | розходяться | 1 | |
| 15 | Листок: переважаюча форма основи | тупа | 2 | |
| 16 | Листок: глянуватість верхнього боку | слабка | 2 | |
| 17 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку | помірна | 5 | |
| 18 | За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік) | слабка | 3 | |
| 19 | За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку | помірне | 5 | |
| 20 | За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку | помірно-зелене | 3 | RHS - 135C |
| 21 | Край листка: кількість надрізів | середня | 5 | |
| 22 | Край листка: надрізи за глибиною | глибокі | 7 | |
| 23 | Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма | ознака не визначається | 0 | |
| 24 | Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця | ознака не визначається | 0 | |
| 25 | Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом | ознака не визначається | 0 | |
| 26 | Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків | ознака не визначається | 0 | |
| 27 | Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі | ознака не визначається | 0 | |
| 28 | Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині | середня | 5 | |
| 29 | Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття | оранжево-коричневе | 45 | RHS - 032C |
| 30 | Кошик: тип | повний | 5 | |
| 31 | За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип | ознака не визначається | 0 | |
| 32 | Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини) | великий | 7 | |
| 33 | Кошик: діаметр (великоквіткові рослини) | ознака не визначається | 0 | |
| 34 | Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини) | середній | 5 | |
| 35 | Кошик: за висотою (великоквіткові рослини) | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Квітконіжка: за довжиною | середня | 5 | |
| 37 | Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток) | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток | ознака не визначається | 0 | |
| 39 | Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток | щільна | 7 | |
| 40 | Кошик: кількість типів язичкових квіток | один | 1 | |
| 41 | Кошик: переважаючий тип язичкових квіток | трубчастий | 4 | |
| 42 | Кошик: вторинний тип язичкових квіток | ознака не визначається | 0 | |
| 43 | Кошик: додатковий тип язичкових квіток | ознака не визначається | 0 | |
| 44 | Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини | ознака не визначається | 0 | |
| 45 | Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні | ребриста | 2 | |
| 46 | Язичкова квітка: кількість кілів | ознака не визначається | 0 | |
| 47 | Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка | довга | 7 | |
| 48 | Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки) | ознака не визначається | 0 | |
| 49 | Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки) | ознака не визначається | 0 | |
| 50 | Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки) | ознака не визначається | 0 | |
| 51 | Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток) | округлий | 1 | |
| 52 | Язичкова квітка: характер поздовжньої осі | загнута всередину | 1 | |
| 53 | Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина | дистальні три четвертини | 7 | |
| 54 | Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину | помірний | 5 | |
| 55 | Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка) | ознака не визначається | 0 | |
| 56 | Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь) | ознака не визначається | 0 | |
| 57 | Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь) | слабкий | 3 | |
| 58 | Язичкова квітка: за довжиною | довга | 7 | |
| 59 | Язичкова квітка: за шириною | вужька | 3 | |

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|------------------------|-----|------------|
| 60 | Язичкова квітка: відношення довжина/ширина | мале | 3 | |
| 61 | Язичкова квітка: форма кінчика | гостра | 1 | |
| 62 | Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку | один | 1 | |
| 63 | Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку | світло-жовто-оранжеве | 12 | RHS - 020C |
| 64 | Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 65 | Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 66 | Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 67 | Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 68 | Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 69 | Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 70 | Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім | чітко відрізняється | 2 | |
| 71 | Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього | оранжево-коричневе | 45 | RHS - 169A |
| 72 | Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(ix) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка) | ознака не визначається | 0 | RHS - 020C |
| 73 | Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(ix) рядка(ів) | оранжево-коричневе | 45 | RHS - 169A |
| 74 | Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 75 | Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 76 | Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика | ознака не визначається | 0 | |
| 77 | Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу | ознака не визначається | 0 | |
| 78 | Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пелючків | ознака не визначається | 0 | |
| 79 | Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пелючків | ознака не визначається | 0 | |
| 80 | Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пелючків | ознака не визначається | 0 | |
| 81 | Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пелючків | ознака не визначається | 0 | |
| 82 | Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пелючків | ознака не визначається | 0 | |
| 83 | Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пелючків | ознака не визначається | 0 | |
| 84 | Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пелючків | ознака не визначається | 0 | |
| 85 | Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диска квітка: тип | ознака не визначається | 0 | |
| 86 | Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диска квітка: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 87 | Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диска квітка: забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 88 | Група реакції (вирощування за контрольованою тривалістю дня) | ознака не визначається | 0 | |
| 89 | Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння | ранній | 3 | |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослин, см – 70,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 80. Діаметр суцвіття (кошика), см – 8,0. Тривалість цвітіння рослини, дів – 35. Декоративність, бал (11–99) – 96. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 50. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 7; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.