

**Вид:** Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка №** 19019016 **Назва сорту:** Пірошок **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498**Дата пріоритету:** 12.11.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.09.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 220581**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	піраміdalна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижені колоси: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижені колоси: вигин першого сегмента	великий	7	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення центральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодицул	фронтальні	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубоозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скочена	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,24	6,65	6,29
урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,64	6,09	6,79
+,- до усередненої урожайності, т/га	2,40	-0,56	0,50
+,- до усередненої урожайності, %	45,8	-8,4	7,5
Довірчий інтервал, т/га	0,19	0,19	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб	270	266	262
Висота рослин, см	86,4	79,1	81,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,8	51	50,1
Вміст білка, %	13,9	13	11,7
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурої тріж, бал	8	9	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** П.