

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 19040067 Назва сорту: Алішер Заявник (код): 1807 Власник сорту (код): 1807

Дата пріоритету: 27.06.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.09.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220535

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	до середньої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,31	3,42	2,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	2,70	2,36
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,17	-0,72	-0,28
+, - до усередненої урожайності, %	7,4	-21,1	-8,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	288	289	309
Висота рослини, см	117,8	123,7	138,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5	5,1
Вміст білка, %	20,1	17,6	17,6
Вміст олії, %	45,4	47,7	47,9
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,5	0,5	0,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	5	6
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	5	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	6	7	5
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	6	7	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	6
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	7	6
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.