

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 19040016 Назва сорту: Джеремі **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220481

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	до середнього
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгої
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,93	3,34	2,53
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,66	3,33	2,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,73	-0,01	0,32
+, - до усередненої урожайності, %	37,8	-0,3	9,6
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб	291	298	311
Висота рослини, см	104,8	117,7	116,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5,1	5,5	5,6
Вміст білка, %	20	17,8	17,2
Вміст олії, %	46	48,2	47,9
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	6	8	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	5	7	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	9	5
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	7	6
Блок	4	4	4
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.