

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 20040043 Назва сорту: ПТ305 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220506

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,31	3,42	2,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,40	3,67	3,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,09	0,25	0,57
+, - до усередненої урожайності, %	47,2	7,3	16,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, днів	295	314	314
Висота рослини, см	125	124,6	139,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	4,8
Вміст білка, %	18,8	17,2	18,1
Вміст олії, %	46,9	49,1	48,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	6	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	5	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	6	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.