

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 20040058 Назва сорту: Седрік **Заявник (код):** 2524 **Власник сорту (код):** 2524

Дата пріоритету: 05.06.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220511

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,31	3,42	2,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,75	3,21	2,81
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,44	-0,21	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	19,0	-6,1	5,0
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	294	314	312
Висота рослини, см	118,6	118,3	128
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,5	5,4
Вміст білка, %	19,7	17,4	18,6
Вміст олії, %	46,8	49,3	48,1
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0
Вміст глюканолатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	6	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	6	7	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	6	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.