

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 14040027 Назва сорту: IHB1030 Заявник (код): 1991 Власник сорту (код): 1991

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180338

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з частковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за ширину	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,5	29,4	20,1
± до усередненої урожайності, ц/га	1,2	-1,1	-6,3
± до усередненої урожайності, %	6	-4	-24
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,2	8,8
Стійкість до осипання, бал	8	7,4	7,2
Зимостійкість, бал	9	7,5	8
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8	8,6	7,2
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	8,4	6,8
Стійкість до бактеріозу, бал	9	8,6	7,2
Стійкість до пероноспорозу, бал	8	8,6	6
Вміст білка, %	24,1	21,7	19,7
Вміст олії, %	46,7	48,5	49,8
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,5	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.